




Sorte: Cabernet Jura

Hitzestress: Geringe Resilienz (Blattscheibentest), Induktion sowohl von Hitzeschockprotein 17 wie 18 ähnlich wie bei Riesling.

Trockenstress: nicht getestet

Sonnenbrand: nicht getestet

Potential für die Anwendung: nur mäßige Hitzetoleranz, Trockenresistenz und Resistenz gegen Sonnenbrand noch nicht getestet. Rote PiWi-Sorte mit Resistenz gegen Falschen Mehltau, kältetolerant, da von der sibirischen *V. amurensis* abstammend.



Kontakt: Peter Nick, KIT-JKIP, peter.nick@kit.edu

Stand: 30.04.2025

Faible résilience (test du disque foliaire), induction des protéines de choc thermique 17 et 18 significativement plus faible que même dans le Riesling




Variété: Cabernet Jura

Stress thermique: Faible résilience (test du disque foliaire), induction des protéines de choc thermique 17 et 18 similaire au Riesling.

Potentiel d'application: seulement une tolérance modérée à la chaleur, une résistance à la sécheresse et une résistance aux coups de soleil non encore testées. Variété PiWi rouge résistante au mildiou, tolérante au froid, car dérivée du *V. amurensis* sibérien.

Stress secheresse: pas évalué

Coup de soleil: pas évalué



Contact: Peter Nick, KIT-JKIP, peter.nick@kit.edu

Actualisé: 07.05.2025